

## ORTOSTATISK BLODTRYKSMÅLING

Pt. navn og CPR:

Dato: \_\_\_\_\_

Forud for undersøgelsen har patienten ligget og hvilet i tempereret klima i min. 5 min.

Pt. skal rejse sig direkte fra liggende til stående (IKKE sidde undervejs).

Hvis synkope eller faldrisiko; vær ikke alene med pt.!

**Blodtryk (BT) måles i begge arme – man fortsætter derefter BT måling på armen med højeste BT.**

Blodtryksmåling	BT og puls	Symptomer
Liggende Hø.: Ve.:		
Stående		
Stående efter 1 min.		
Stående efter 2 min.		
Stående efter 3 min.		
Stående efter 4 min.		
Stående efter 5 min.		
Stående efter 7 min.		
Stående efter 9 min.		
Stående efter 10 min.		

**Måling efter 5 min. kun ved stærk mistanke om ortostatisk hypotension og insignifikant BT-fald v. op til 5 min.'s målinger.**

Undersøgelsen udført af: \_\_\_\_\_

Resultat af test (positiv/negativ): \_\_\_\_\_

**Positiv test (dvs. ortostatisk hypotension):** Systolisk BT-fald, over 20 mmHg, eller diastolisk BT-fald, over 10 mmHg, og/eller systolisk BT-fald til under 90 mmHg (fra f.eks. 105 mmHg).

Dette med eller uden symptomer og/eller med eller uden pulsstigning!